

CAPÍTULO 3

**Caracterização morfológica
dos clones IAC**

A caracterização morfológica dos clones foi realizada nos clones com até 6 meses de idade em plantas jovens no jardim clonal.

1. LANÇAMENTO FOLIAR

1.1 Formato

- 1.1.1 Agudo: IAC 403, IAC 410, IAC 411, IAC 417, IAC 418, IAC 505, IAC 506, RRIM 600
- 1.1.2 Obtuso: IAC 401, IAC 406, IAC 425, IAC 502, IAC 503, GT1
- 1.1.3 Arredondado: IAC 400, AC 404, IAC 405, IAC 511
- 1.1.4 Achatado: IAC 402, IAC 407, IAC 409, IAC 412, IAC 500, IAC 501, IAC 504, IAC 507, IAC 512

1.2 Separação

- 1.2.1 Bem separado: IAC 400, IAC 401, IAC 403, IAC 404, IAC 405, IAC 406, IAC 407, IAC 409, IAC 410, IAC 500, IAC 501, IAC 502, IAC 506, IAC 507, IAC 511, IAC 512
- 1.2.2 Pouco separado: IAC 403, IAC 404, IAC 407, IAC 409, IAC 412, IAC 503, IAC 504, IAC 505

1.3 Densidade dos lançamentos foliares

- 1.3.1 Escassa: IAC 406, IAC 500, IAC 507, IAC 512
- 1.3.2 Média: IAC 400, IAC 403, IAC 404, IAC 405, IAC 407, IAC 410, IAC 411, IAC 412, IAC 417, IAC 418, IAC 425, IAC 501, IAC 503, IAC 504, IAC 505
- 1.3.3 Alta: IAC 401, IAC 420, IAC 502, IAC 506, IAC 511

2. FOLÍOLOS

2.1 A posição relativa do folíolo central em relação aos outros folíolos

- 2.1.1 Encavalada: IAC 401, IAC 404, IAC 405, IAC 411, IAC 425, IAC 507
- 2.1.2 Tocando: IAC 403, IAC 417, IAC 418, IAC 420, IAC 501
- 2.1.3 Separada: IAC 400, IAC 406, IAC 407, IAC 410, IAC 412, IAC 413, IAC 500, IAC 502, IAC 503, IAC 504, IAC 505, IAC 506, IAC 511, IAC 512

2.2 Forma do folíolo

- 2.2.1 Lanceolada estreita: IAC 400, IAC 425, IAC 502
- 2.2.2 Lanceolada grande: IAC 403, IAC 410, IAC 511
- 2.2.3 Elíptica: IAC 401, IAC 405, IAC 406, IAC 407, IAC 412, IAC 417, IAC 418, IAC 500, IAC 501, IAC 504, IAC 505, IAC 506, IAC 507, IAC 512
- 2.2.4 Obovoide: IAC 404, IAC 411, IAC 418, IAC 420, IAC 503

2.3 Formato da base

- 2.3.1 Afilado: IAC 400, IAC 410, IAC 504, IAC 505, IAC 506, IAC 511
- 2.3.2 Cuneiforme: IAC 401, IAC 403, IAC 404, IAC 406, IAC 407, IAC 412, IAC 413, IAC 420, IAC 425, IAC 500, IAC 501, IAC 502
- 2.3.3 Obtuso: IAC 404, IAC 405, IAC 411, IAC 417, IAC 418, IAC 503, IAC 507, IAC 512

<https://doi.org/10.4322/978-65-86819-29-8.00003>



Este é um capítulo publicado em acesso aberto (Open Access) sob a licença Creative Commons Attribution, que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições desde que o trabalho original seja corretamente citado.

- 2.4 Formato do ápice, exceto a ponta
 - 2.4.1 Agudo: IAC 400, IAC 413, IAC 500, IAC 504, IAC 511
 - 2.4.2 Obtuso: IAC 401, IAC 403, IAC 406, IAC 407, IAC 410, IAC 412, IAC 420, IAC 425, IAC 501, IAC 502, IAC 505, IAC 506, IAC 507
 - 2.4.3 Arredondado: IAC 404, IAC 405, IAC 411, IAC 417, IAC 418, IAC 503, IAC 512
- 2.5 Simetria da lâmina foliar
 - 2.5.1 Simétrica: IAC 400, IAC 401, IAC 403, IAC 404, IAC 410, IAC 411, IAC 412, IAC 413, IAC 418, IAC 420, IAC 425, IAC 500, IAC 501, IAC 503, IAC 504, IAC 511
 - 2.5.2 Foliolo central diferente dos laterais: IAC 405, IAC 407, IAC 417, IAC 502, IAC 505, IAC 506, IAC 507, IAC 512
- 2.6 Margem
 - 2.6.1 Lisa: IAC 405, IAC 406, IAC 411, IAC 412, IAC 417, IAC 418, IAC 420, IAC 500, IAC 504, IAC 505, IAC 506, IAC 507, IAC 512
 - 2.6.2 Ondulada média: IAC 401, IAC 404, IAC 407, IAC 413, IAC 425, IAC 501, IAC 502, IAC 511
 - 2.6.3 Ondulada forte: IAC 400, IAC 403, IAC 410, IAC 503
- 2.7 Textura
 - 2.7.1 Lisa: IAC 401, IAC 403, IAC 404, IAC 405, IAC 407, IAC 410, IAC 411, IAC 412, IAC 418, IAC 501, IAC 503, IAC 504, IAC 505, IAC 506, IAC 507, IAC 511, IAC 512
 - 2.7.2 Média: IAC 406, IAC 417, IAC 500, IAC 502, IAC 503, IAC 504
 - 2.7.3 Rugosa: IAC 400, IAC 420, IAC 425, IAC 505
- 2.9 Nervos na parte inferior
 - 2.9.1 Ausentes: IAC 505
 - 2.9.2 Presentes: IAC 400, IAC 401, IAC 402, IAC 403, IAC 404, IAC 405, IAC 406, IAC 407, IAC 409, IAC 410, IAC 411, IAC 412, IAC 413, IAC 418, IAC 420, IAC 425, IAC 500, IAC 501, IAC 502, IAC 503, IAC 504, IAC 506, IAC 507, IAC 511, IAC 512
- 2.10 Comprimento da lâmina do folíolo
 - 2.10.1 Curto: IAC 400, IAC 406, IAC 407, IAC 411, IAC 412, IAC 413, IAC 417, IAC 418, IAC 420, IAC 501, IAC 503, IAC 504, IAC 505, IAC 507, IAC 512
 - 2.10.2 Médio: IAC 401, IAC 403, IAC 404, IAC 405, IAC 410, IAC 500, IAC 506
 - 2.10.3 Longo: IAC 425, IAC 502, IAC 511
- 2.11 Posição da parte mais larga da lâmina do folíolo
 - 2.11.1 Base: nenhum clone
 - 2.11.2 Meio: IAC 401, IAC 403, IAC 404, IAC 405, IAC 406, IAC 407, IAC 410, IAC 412, IAC 417, IAC 418, IAC 420, IAC 425, IAC 501, IAC 502, IAC 504, IAC 505, IAC 506, IAC 507, IAC 511
 - 2.11.3 Ápice: IAC 400, IAC 405, IAC 411, IAC 500, IAC 503, IAC 512
- 2.12 Intensidade da cor do folíolo na parte adaxial
 - 2.12.1 Clara: IAC 400, IAC 403, IAC 404, IAC 405, IAC 406, IAC 407, IAC 413, IAC 417, IAC 502, IAC 505
 - 2.12.2 Média: IAC 401, IAC 410, IAC 412, IAC 418, IAC 420, IAC 425, IAC 506, IAC 507
 - 2.12.3 Escura: IAC 411, IAC 500, IAC 501, IAC 503, IAC 504, IAC 511
- 2.13 Brilho na parte adaxial do folíolo adaxial
 - 2.13.1 Ausente: IAC 404, IAC 500, IAC 512
 - 2.13.2 Médio: IAC 401, IAC 403, IAC 405, IAC 407, IAC 410, IAC 411, IAC 417, IAC 502, IAC 504, IAC 505, IAC 507
 - 2.13.3 Forte: IAC 400, IAC 406, IAC 412, IAC 413, IAC 418, IAC 420, IAC 425, IAC 501, IAC 503, IAC 511, IAC 506

3. PECÍOLO

- 3.1 Atitude do folíolo: lâmina do folíolo em relação ao pecíolo
 - 3.1.1 Semiereta: IAC 400, IAC 401, IAC 403, IAC 407, IAC 410, IAC 418, IAC 500, IAC 501, IAC 507, IAC 512
 - 3.1.2 Horizontal: IAC 404, IAC 405, IAC 411, IAC 417, IAC 420, IAC 502, IAC 511
 - 3.1.3 Semi-inclinada: IAC 412, IAC 413, IAC 425, IAC 503, IAC 504, IAC 505
- 3.2 Comprimento do pecíolo: alguns clones possuem pecíolos curtos, médios ou longos
 - 3.2.1 Curto: IAC 401, IAC 407, IAC 420, IAC 425, IAC 502, IAC 504, IAC 511, IAC 512
 - 3.2.2 Médio: IAC 403, IAC 406, IAC 411, IAC 412, IAC 417, IAC 505
 - 3.2.3 Longo: IAC 400, IAC 404, IAC 405, IAC 410, IAC 413, IAC 418, IAC 500, IAC 501, IAC 503, IAC 506, IAC 507

4. PECIÓLULO: CONEXÃO ENTRE O FOLÍOLO E O PECÍOLO

- 4.1 Ângulo entre peciólulo
 - 4.1.1 Agudo: IAC 401, IAC 403, IAC 404, IAC 405, IAC 407, IAC 411, IAC 417, IAC 418, IAC 420, IAC 425, IAC 500, IAC 501, IAC 505
 - 4.1.2 Reto: IAC 400, IAC 406, IAC 410, IAC 413, IAC 502, IAC 503, IAC 504, IAC 506, IAC 511, IAC 512
 - 4.1.3 Obtuso: nenhum



Planta com 4 meses de idade.



Formato do lançamento: redondo, com média densidade das folíolos.



Folíolos separados e em forma lanceolada estreita, com média ondulação.



Ângulo reto entre os pecíolos e base afilada.



Pecíolo longo e semiereto.




Planta com 4 meses de idade.



Formato do lançamento: obtuso, com alta densidade dos folíolos.



Folíolos encavalados e em forma elíptica, com média ondulação de margem e folíolos de tamanho similar.



Ângulo agudo entre os pecíolos, base obtusa e brilho intenso.



Pecíolo curto e semiereto.




Planta com 4 meses de idade.



Formato do lançamento: agudo, com média densidade dos folíolos.



Folíolos tocando e em forma lanceolada larga, com forte ondulação da margem.



Ângulo agudo entre os pecíolos e base cuneiforme.



Pecíolo longo e semiereto.




Planta com 4 meses de idade.




Formato do lançamento: redondo, com média densidade dos folíolos.



Folíolos encavalados e em forma obovoide, com média ondulação da margem.



Ângulo agudo entre os pecíolos e base cuneiforme.



Pecíolo longo e horizontal.




Planta com 4 meses de idade.




Formato do lançamento: redondo com escassa densidade dos folíolos.



Folíolos tocando e em forma elíptica, sem ondulação.



Ângulo agudo entre os pecíolos e base obtusa.



Pecíolo longo e horizontal.



Planta com 4 meses de idade.




Formato do lançamento: obtuso, com escassa densidade dos folíolos e longo espaço entre os lançamentos.



Folíolos bem separados e em forma elíptica, sem ondulação da margem.



Ângulo reto entre os pecíolos, base afilada e forte intensidade do brilho.



Pecíolo médio e horizontal.




Planta com 4 meses de idade.




Formato do lançamento: agudo, com escassa densidade dos folíolos.



Folíolos tocando e em forma elíptica, com leve ondulação da margem.



Ângulo agudo entre os pecíolos e base afilada.



Pecíolo longo e semiereto.




Planta com 4 meses de idade.



Formato do lançamento: agudo, com média densidade dos folíolos.



Folíolos bem separados e em forma lanceolada larga, com forte ondulação da margem.



Ângulo reto entre os pecíolos, base afilada e forte intensidade do brilho.



Pecíolo longo e semiereto.



Planta com 4 meses de idade.



Formato do lançamento: obtuso, com grande espaço entre os lançamentos.



Folíolos encavalados e em forma obovoide.



Ângulo agudo entre os pecíolos e base obtusa.



Pecíolo médio e horizontal.




Planta com 4 meses de idade.




Formato do lançamento: achatado, com escassa densidade dos folíolos.



Folíolos bem separados e em forma elíptica, com leve ondulação da margem.



Ângulo reto entre os pecíolos, base cuneiforme e brilho intenso.



Pecíolo médio e semi-inclinado.



Planta com 4 meses de idade.




Formato do lançamento: redondo, com média densidade dos folíolos e espaço médio entre os lançamentos.



Folíolos bem separados e em forma elíptica, com forte ondulação.



Ângulo agudo entre os pecíolos, base afilada e brilho intenso.



Pecíolo longo e semi-inclinado.




Planta com 4 meses de idade.




Formato do lançamento: agudo, com média densidade dos folíolos.



Folíolos bem separados e em forma elíptica, com folíolo central um pouco maior que os laterais.



Ângulo agudo entre os pecíolos e base obtusa.



Pecíolo curto e horizontal.




Planta com 4 meses de idade.




Formato do lançamento: obtuso, com média densidade dos folíolos.



Folíolos tocando e em forma obtusa, com muito brilho.



Ângulo agudo entre os pecíolos e base obtusa.



Pecíolo longo e semiereto.




Planta com 4 meses de idade.



Formato do lançamento: redondo, com alta densidade dos folíolos e curto espaço entre os lançamentos.



Folíolos bem separados e em forma obovoide, com folíolo central maior que os laterais.



Ângulo agudo entre os pecíolos, base obtusa e brilho intenso.



Pecíolo curto e horizontal.




Planta com 4 meses de idade.




Formato do lançamento: obtuso, com média densidade dos folíolos e longo espaço entre os lançamentos.



Folíolos encavalados e em forma lanceolada larga, semelhantes, sem ondulação da margem.



Ângulo agudo entre os pecíolos e base cuneiforme.



Pecíolo curto e semi-inclinado.



Planta com 4 meses de idade.




Formato do lançamento: achatado, com escassa densidade de folíolos.



Folíolos separados e em forma elíptica, sem ondulação da margem.



Ângulo agudo entre os pecíolos, base afilada e folíolos com pouco brilho.



Pecíolo longo e semiereto.



Planta com 4 meses de idade.




Formato do lançamento: achatado, com média densidade de folíolos, com espaço entre lançamentos intermediário.



Folíolos tocando e em forma elíptica, com moderada ondulação da margem.



Ângulo agudo entre os pecíolos, base cuneiforme e folíolos com brilho intenso.



Pecíolo longo e horizontal.



Planta com 4 meses de idade.



Formato do lançamento: obtuso, com alta densidade de folíolos e espaço intermediário entre os lançamentos.



Folíolos bem separados e em forma lanceolada estreita, com folíolo central maior que os laterais.



Ângulo reto entre os pecíolos, base cuneiforme e brilho médio.



Pecíolo médio e horizontal.



Planta com 4 meses de idade.



Formato do lançamento: obtuso, com média densidade de folíolos e curto espaço entre os lançamentos.



Folíolos bem separados e em forma obovoide, com forte ondulação da margem.



Ângulo reto entre os pecíolos, base afilada e brilho intenso.



Pecíolo médio e semi-inclinado.



Planta com 4 meses de idade.




Formato do lançamento: achatado, com média densidade de folíolos e curto espaço entre os lançamentos.



Folíolos bem separados e em forma elíptica, com folíolo central semelhante aos laterais.



Ângulo reto entre os pecíolos, base afilada, brilho médio e coloração verde-escura.



Pecíolo curto e semi-inclinado.




Planta com 4 meses de idade.



Formato do lançamento: agudo, com média densidade de folíolos e curto espaço entre os lançamentos.



Folíolos bem separados e em forma elíptica, com alta intensidade de brilho nos folíolos.



Ângulo agudo entre os pecíolos, base cuneiforme, venação amarela e brilho intenso.



Pecíolo longo e semi-inclinado.



Planta com 4 meses de idade.




Formato do lançamento: agudo, com alta densidade de folíolos e grande espaço entre os lançamentos.



Folíolos separados e em forma elíptica, com folíolo central diferente dos laterais.



Ângulo reto entre os pecíolos e base cuneiforme.



Pecíolo longo e semiereto, com posição dos folíolos em relação ao pecíolo voltada para baixo.




Planta com 4 meses de idade.




Formato do lançamento: achatado, com escassa densidade de folíolos.



Folíolos tocando e em forma elíptica, com folíolo central diferente dos laterais.



Ângulo agudo entre os pecíolos, base obtusa e brilho fraco.



Pecíolo longo e horizontal.



Planta com 4 meses de idade.




Formato do lançamento: redondo com alta densidade de folíolos.



Folíolos bem separados e em forma lanceolada larga, com forte intensidade de brilho.



Ângulo reto entre os pecíolos, base afilada e coloração verde-escura.



Pecíolo curto e horizontal.




Planta com 4 meses de idade.



Formato do lançamento: achatado, com escassa densidade de folíolos e longo espaço entre os lançamentos.



Folíolos separados e em forma elíptica, com folíolo central maior que os laterais.



Ângulo reto entre os pecíolos, base cuneiforme e brilho fraco.



Pecíolo curto e semiereto.



Planta com 4 meses de idade.



Formato do lançamento: obtuso, com alta densidade de folíolos.



Folíolos bem separados e em forma elíptica.



Ângulo agudo entre os pecíolos e folíolos verde-escuros.



Pecíolo médio e semiereto.



Planta com 4 meses de idade.




Formato do lançamento: obtuso, com grande espaço entre os lançamentos.



Folíolos bem separados e em forma elíptica.



Ângulo agudo entre os pecíolos, folíolos verdes claros e brilho moderado.



Pecíolo curto e semiereto.

Quadro 1. Quadro de diagnóstico dos clones.

Descritores	IAC 500	IAC 501	IAC 502	IAC 505	IAC 506	IAC 507	IAC 511	RRIM 600
Lançamento foliar	Achatado, densidade escassa, bem separado	Achatado, densidade média, bem separado	Obtuso, densidade alta, bem separado	Agudo, densidade média, curta distância entre os lançamentos	Agudo, densidade média, bem separado	Achatado, densidade escassa, bem separado	Arredondado, densidade alta, bem separado	Agudo, densidade alta, bem separado
Formato do folíolo central em relação aos laterais	Similar	Similar	Diferente	Diferente	Diferente	Diferente	Similar	Similar
Posição relativa com os folíolos laterais	Separada	Tocando	Separada	Separada	Separada	Encavalada	Separada	Separada
Comprimento da lâmina foliar	Curto	Curto	Longo	Curto	Médio	Médio	Longo	Médio
Intensidade da cor do folíolo na parte adaxial	Escura	Clara	Clara	Clara	Média	Média	Média	Clara
Brilho na parte adaxial do folíolo adaxial	Fraco	Forte	Médio	Forte	Forte	Médio	Médio	Forte
Textura na parte adaxial do folíolo adaxial	Média	Lisa	Média	Rugosa	Lisa	Lisa	Lisa	Média
Nervos na parte inferior	Presentes	Presentes	Presentes	Ausentes	Presentes	Presentes	Presentes	Presentes
Lâmina do folíolo em relação ao pecíolo	Semiereta	Semi-inclinada	Horizontal	Semi-inclinada	Semiereta	Semiereta	Horizontal	Horizontal
Lâmina do pecíolo: comprimento	Longo	Médio	Longo	Longo	Longo	Longo	Longo	Curto
Lâmina do folíolo: parte mais larga	Ápice	Meio	Meio	Meio	Meio	Meio	Meio	Meio
Eixo na seção longitudinal	Sigmoide	Sigmoide	Sigmoide	Convexo	Convexo	Sigmoide	Sigmoide	Convexo
Ondulação da margem	Ausente	Média	Média	Ausente	Ausente	Ausente	Média	Média
Formato da base	Afilado	Cuneiforme	Cuneiforme	Afilado	Afilado	Cuneiforme	Afilado	Cuneiforme
Formato do ápice, exceto a ponta	Agudo	Obtuso	Obtuso	Obtuso	Obtuso	Obtuso	Agudo	Agudo
Forma do folíolo	Aguda	Elíptica	Lanceolada estreita	Elíptica	Elíptica	Elíptica	Lanceolada grande	Lanceolada grande
Comprimento com folíolos laterais	Maior	Igual	Maior	Maior	Igual	Maior	Igual	Maior
Pecíolo: ângulo entre folíolos	Agudo	Agudo	Reito	Agudo	Agudo	Agudo	Reito	Médio
HP: diâmetro	Pequeno	Médio	Médio	Médio			Largo	Médio
HP: espaço entre os lançamentos	Comprido	Médio	Curto	Curto	Comprido	Médio	Médio	Médio

Quadro 1. Continuação...

Descritores	IAC 400	IAC 401	IAC 403	IAC 404	IAC 405	IAC 406	IAC 407	IAC 410	IAC 407
Lançamento foliar	Arredondado, densidade média, bem separado	Obtuso densidade alta, bem separado	Agudo, densidade média, bem separado	Arredondado, densidade média, bem separado	Arredondado, densidade média, bem separado	Obtuso, densidade escassa, bem separado	Achatado, densidade média, bem separado	Agudo, densidade média, bem separado	Achatado, densidade média, bem separado
Formato do folíolo central em relação aos laterais	Similar	Similar	Similar	Similar	Diferente	Similar	Diferente	Similar	Diferente
Posição relativa com os folíolos laterais	Separada	Encavalada	Tocando	Encavalada	Encavalada	Separada	Separada	Separada	Separada
Comprimento da lâmina foliar	Curto	Médio	Médio	Médio	Médio	Curto	Curto	Médio	Curto
Intensidade da cor do folíolo na parte adaxial	Clara	Média	Clara	Clara	Clara	Clara	Clara	Média	Clara
Brilho na parte adaxial do folíolo adaxial	Forte	Médio	Médio	Ausente	Médio	Forte	Médio	Médio	Médio
Textura na parte adaxial do folíolo adaxial	Rugosa	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa	Média	Lisa	Lisa	Lisa
Nervos na parte inferior	Presentes	Presentes	Presentes	Presentes	Presentes	Presentes	Presentes	Presentes	Presentes
Lâmina do folíolo em relação ao pecíolo	Semiereta	Semiereta	Semiereta	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Semiereta	Semiereta	Semiereta
Lâmina do pecíolo: comprimento	Longo	Curto	Médio	Longo	Longo	Médio	Curto	Longo	Curto
Lâmina do folíolo: parte mais larga	Ápice	Meio	Meio	Meio	Ápice	Meio	Meio	Meio	Meio
Eixo na seção longitudinal	Convexo	Sigmoide	Convexo	Sigmoide	Convexo	Convexo	Convexo	Sigmoide	Convexo
Ondulação da margem	Forte	Média	Forte	Média	Ausente	Ausente	Média	Forte	Média
Formato da base	Afiado	Cuneiforme	Cuneiforme	Obtuso	Obtuso	Cuneiforme	Afiado	Afiado	Afiado
Formato do ápice, exceto a ponta	Agudo	Obtuso	Obtuso	Arredondado	Arredondado	Obtuso	Obtuso	Obtuso	Obtuso
Forma do folíolo	Lanceolada estreita	Elíptica	Lanceolada larga	Obovoide	Elíptica	Elíptica	Elíptica	Lanceolada grande	Elíptica
Comprimento com folíolos laterais	Maior	Igual	Maior	Maior	Maior	Maior	Maior	Maior	Maior
Pecíolo: ângulo entre folíolos	Reto	Agudo	Agudo	Agudo	Agudo	Médio	Agudo	Reto	Agudo
HP: diâmetro	Pequeno	Médio	Médio	Médio	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Médio	Pequeno
HP: espaço entre os lançamentos	Comprido	Médio	Médio	Comprido	Comprido	Comprido	Curto	Médio	Curto

Quadro 1. Continuação...

Descritores	IAC 411	IAC 412	IAC 413	IAC 417	IAC 418	IAC 420	IAC 425	GT1
Lançamento foliar	Obtuso, densidade média, bem separado	Achatado, densidade média, bem separado	Arredondado, densidade média, bem separado	Agudo, densidade média, bem separado	Achatado, densidade média, bem separado	Arredondado, densidade alta, bem separado	Obtuso, densidade média, bem separado	Obtuso, densidade alta
Formato do folíolo central em relação aos laterais	Similar	Similar	Similar	Diferente	Similar	Similar	Similar	Similar
Posição relativa com os folíolos laterais	Encavalada	Separada	Separada	Tocando	Tocando	Separada	Encavalada	Tocando
Comprimento da lâmina foliar	Médio	Médio	Médio	Médio	Médio	Médio	Médio	Longo
Intensidade da cor do folíolo na parte adaxial	Escura	Média	Clara	Clara	Média	Média	Média	Escura
Brilho na parte adaxial do folíolo adaxial	Médio	Forte	Forte	Médio	Forte	Forte	Forte	Forte
Textura na parte adaxial do folíolo adaxial	Lisa	Lisa	Lisa	Média	Lisa	Rugosa	Rugosa	Lisa
Nervos na parte inferior	Presentes	Presentes	Presentes	Presentes	Presentes	Presentes	Presentes	Presentes
Lâmina do folíolo em relação ao pecíolo	Horizontal	Semi-inclinada	Semi-inclinada	Horizontal	Semiereta	horizontal	Semi-inclinada	Semiereta
Lâmina do pecíolo: comprimento	Médio	Médio	Longo	Médio	Longo	Curto	Curto	Curto
Lâmina do folíolo: parte mais larga	Meio	Meio	Meio	Ápice	Meio	Meio	Meio	Meio
Eixo na seção longitudinal	Sigmoide	Convexo	Sigmoide	Sigmoide	Convexo	Sigmoide	Sigmoide	Sigmoide
Ondulação da margem	Ausente	Ausente	Média	Ausente	Ausente	Ausente	Média	Ausente
Formato da base	Obtuso	Cuneiforme	Afilado	Obtuso	Obtuso	Cuneiforme	Cuneiforme	Cuneiforme
Formato do ápice, exceto a ponta	Arredondado	Obtuso	Agudo	Arredondado	Arredondado	Obtuso	Obtuso	Obtuso
Forma do folíolo	Obovoide	Elíptica	Elíptica	Elíptica	Obovoide	Obovoide	Lanceolada estreita	Elíptica
Comprimento com folíolos laterais	Maior	Maior	Igual	Igual	Maior	Maior	Igual	Maior
Pecíolo: ângulo entre folíolos	Agudo	Agudo	Médio	Agudo	Agudo	Agudo	Agudo	Agudo
HP: diâmetro	Pequeno	Largo	Reto	Reto	Largo	Largo	Largo	Pequeno
HP: espaço entre os lançamentos	Comprido	Médio	Comprido	Médio	Comprido	Comprido	Comprido	Médio